

МАСТИНДОЛ

Капсула №30

Состав: 1 капсула содержит:

Индол-3-карбинол – 300 мг

Эпигаллат – 200 мг

Прутняк – 30 мг

Мелисса – 30 мг

Ромашка – 15 мг

Фармакологическое действие

Индол является универсальным корректором гиперпластических патологических процессов в органах и тканях женской репродуктивной системы (молочной железе, эндометрии, миометрии, шейке матки, яичниках). Нормализует баланс эстрогенов в организме и подавляет их негативное стимулирующее влияние, а также блокирует другие (гормон-независимые) механизмы, активирующие патологический клеточный рост в тканях молочной железы и матки.

Обладает способностью вызывать избирательную гибель трансформированных клеток с аномально высокой пролиферативной активностью.

Активные вещества эпигаллата обладают множественным этиопатогенетическим действием в отношении гиперпластических процессов репродуктивной системы. Подавляют патологический рост и деление клеток в органах и тканях женской репродуктивной системы, обусловленные негормональными стимулами. Снижают инвазивную активность клеток эндометрия, а также вызывают избирательную гибель (апоптоз) клеток повышенной пролиферативной активностью. Эпигаллат обладает выраженным антиангиогенным действием (подавляет патологический рост новых сосудов) и тем самым препятствует росту новообразований.

Показания:

Мета индулин рекомендуется при лечении следующих заболеваний:

Эндометриозаденомиоз, миомы матки, гиперплазия эндометрия без атипии, профилактики рецидивов указанных заболеваний после хирургического лечения, профилактика рака молочной железы, мастопатия

Мета индулин оказывает выраженное тормозящее действие на рецидивирование эндометриоидных кист яичников в послеоперационном периоде.

Способ применения:

Мета индулин рекомендуют внутрь до или во время еды по 1 капсуле 2 раза в день в течение 1-3 месяцев.

При мастопатии Мета индулин рекомендуют внутрь до или во время еды по 1 капсуле 2 раза в день в течение 3 месяцев.

С целью профилактики Мета индулин рекомендуют внутрь до или во время еды по 1 капсуле 2 раза в день в течение 2 месяцев.

При эндометриозе и миоме матки Мета индулин рекомендуют внутрь до или во время еды по 1 капсуле 2 раза в день в течение 3 месяцев.

С целью профилактики Мета индулин рекомендуют внутрь до или во время еды по 1 капсуле 2 раза в день в течение 2 месяцев.

При всех формах папилломавирусной инфекции Мета индулин рекомендуют внутрь до или во время еды в комплексе с иммуномодулирующими или противовирусными препаратами по 1 капсуле 2 раза в день в течение 3 месяцев.

Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость компонентов препарата

Беременные и кормящие женщины

Детский возраст до 14 лет

Условия хранения:

Хранить в сухом и прохладном месте, при температуре не выше 25°C и относительной влажности до 75%, в защищенном от света месте. Беречь от детей.

Срок годности: 2 года